



INFORMATIVA SULLA FIBROLARINGOSCOPIA

Che cos'è la fibrolaringoscopia

È l'esame endoscopico che permette di osservare lo stato delle prime vie aeree e digestive, ovvero fosse nasali, rinofaringe, faringe, laringe e corde vocali, verificando se il rivestimento della loro superficie, cioè la mucosa, presenti anomalie (infiammazioni, polipi o tumori). Per eseguirlo, si utilizza un fibroscopio a fibre ottiche che permette al medico una visione diretta dell'area da analizzare; il fibroscopio può essere anche collegato a una microtelecamera in modo da trasmettere le immagini su un monitor. Grazie a questo esame è possibile studiare il tratto della via aerea superiore e delle corde vocali anche durante il respiro e mentre il paziente parla e mentre deglutisce bolo (acqua, yogurth o MdC a discrezione del medico) somministrato nelle prove di deglutizione.

Come si esegue la fibrolaringoscopia

Il fibrolaringoscopio flessibile viene introdotto attraverso una narice, in modo che raggiunga la rinofaringe, cioè la parte posteriore del naso, e prosegua, poi, in basso verso la faringe e, infine, verso la laringe. L'esame si esegue in un ambulatorio di otorinolaringoiatria e può essere effettuato senza necessità di anestetico oppure in anestesia locale (viene vaporizzato un anestetico a livello faringo-laringeo).

Quanto dura

Qualsiasi esame laringoscopico ambulatoriale ha una durata relativamente breve, indicativamente intorno ai 5-10 minuti

Occorre qualche tipo di preparazione particolare all'esame?

Non sono richieste procedure particolari per prepararsi a una fibrolaringoscopia; tuttavia è consigliabile non bere e non mangiare nelle due-tre ore precedenti l'esame, poiché l'introduzione del laringoscopio potrebbe causare vomito in chi è predisposto a questa reazione. Inoltre, se presenti protesi dentali mobili, sono da rimuovere al momento dell'esame.

Possibili complicanze

- Nausea
- Vomito
- Dolore locale

Controindicazioni

Nessuna in particolare

PER LE DONNE: Informare il Sanitario e/o i Suoi collaboratori di una eventuale gravidanza prima del trattamento.