



ISTRUZIONI DA SEGUIRE PRIMA DI ESEGUIRE IL PRELIEVO DI SANGUE PER LO STUDIO DELLA FUNZIONALITÀ GASTRICA (GASTROPANEL™)

Prima di effettuare un prelievo di sangue venoso per lo studio della funzionalità gastrica (Gastropanel™), è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate in questo modulo, al fine di evitare la possibilità di risultati non attendibili.

1. **Una settimana prima** del prelievo sospendere eventuali terapie con:

- **Inibitori della pompa protonica**, come omeprazolo (es., Antra, Mepral, Omeprazen); esomeprazolo (es., Nexium, Lucen); pantoprazolo (es., Pantorc, Pantopan); rabeprazolo (es., Pariet).
- **Inibitori dei recettori H2**, come ranitidina (es., Zantac, Ranidil); famotidina (es., Famodil, Pepcid)

Qualora il medico curante ritenga non attuabile la sospensione per una settimana di questi farmaci, è necessario avvertire il personale sanitario al momento del prelievo ai fini di una corretta interpretazione dei risultati del test.

2. **Due giorni prima** del prelievo sospendere eventuali terapie con:

- **Antiacidi**, come idrossido di Alluminio e Magnesio (es., Maalox), carbonato di Calcio (es., Tums), bicarbonato di sodio (es., Alka-Seltzer)
- **Agenti protettori della mucosa gastrica**, come sucralfato (es., Sucramal, Gastrogel, Degastril), misoprostolo (es., Cytotec); sodio alginato (es., Gaviscon)

3. **Un giorno prima** del prelievo sospendere eventuali assunzioni di probiotici, nutraceutici e soprattutto alcolici di qualsiasi tipo

4. **6 ore prima** del prelievo è fondamentale:

- Digiuno (evitare assunzione di cibi e bevande)
- Astenersi dal fumo (sigaretta, sigaretta elettronica, pipa, sigaro)